


BULETIN DE AVERTIZARE NR. 7 din 16.04.2026

Oficiul fitosanitar Arad comunică tratamentul din perioada dezmuguritului pentru combaterea acarienilor (*Eriophyes vitis*) și a făinării (*Uncinula necator*) la vița de vie.

Eriophyes vitis



shutterstock.com - 2503749077

Eriophyes vitis (cunoscut și sub numele de *Colomerus vitis*) este un acarian microscopic, denumit popular **acarianul galicol al viței-de-vie** sau **erinoza viței-de-vie**. Acesta provoacă umflături caracteristice pe frunze, care pot părea alarmante, dar care rareori distrug cultura în totalitate dacă sunt gestionate corect. Atacul de *Eriophyes vitis* la **dezmugurit** este momentul critic în care adulții părăsesc locurile de iernare (solzii mugurilor) pentru a coloniza primele frunzulițe. Intervenția în această fază este cea mai eficientă deoarece dăunătorii sunt expuși înainte de a fi protejați în interiorul galeilor (umflăturilor)

Simptome principale

Atacul acestui dăunător este ușor de recunoscut prin următoarele semne:

- **Gale (bășici):** Pe partea superioară a frunzelor apar umflături de formă convexă, cu dimensiuni între 0,5 și 1,5 cm.

- **Erineum (pâslă):** În dreptul umflăturilor, pe partea inferioară a frunzei, se formează o pâslă de peri albi sau gălbui (ca un puf), care ulterior devine brună.
- **Deformări:** Atacul asupra lăstarilor tineri poate duce la scurtarea internodiilor și la o creștere în zig-zag a acestora

Făinarea viței de vie:

- Este cauzată de ciuperca *Uncinula necator*.
- Afectează toate organele verzi ale plantei, inclusiv frunzele, lăstarii și boabele.
- Pe frunze apar depuneri cenușii, iar boabele pot prezenta puncte brune și pot crăpa.
- Atacurile timpurii pot provoca încetinirea creșterii boabelor, care se pot usca.



Efectuați tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. NISSORUN 10WP - 0,5 kg/ha + KUMULUS DF - 0,3% sau
2. OVIPRON TOP - 2,5 l / 100 litri apă + THIOVIT JET 80 WG - 3 kg/ha sau
4. OVIPRON TOP - 2,5 l / 100 litri apă + TOPAS 100EC - 0,3 l/ha sau
5. NISSORUN 10WP - 0,5 kg/ha + VIVANDO - 0,2 l/ha

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor cu efect similar, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la dezmugurit – începutul creșterii lăstarilor. La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului. De asemenea se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI:

- ♦ Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
- ♦ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- ♦ Respectați prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor, postat pe pagina de internet ANF (www.anfdf.ro).
- ♦ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Fermierii pot fi supuși controlului privind respectarea normelor de ecocondiționalitate prin selecția în eșantionul de control și în cazul constatării de neconformități se vor aplica sancțiuni aferente măsurilor pentru care există angajamente.
- ♦ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor

de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum și cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

♦ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați; eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza de aplicare, timpul de pauză, termenul de valabilitate, modul de aplicare, volumul de apă, măsurile de protecție a mediului.

♦ Respectați cu strictețe măsurile pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în adresa de informare nr.273 din 3.02.2022 * In conformitate cu prevederile art 5 alin .(1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor și Ordinului nr.1356/1343/2018/51/2019, toți utilizatorii profesioniști trebuie să dețină un certificat de formare profesională dobândit prin instruire; detalii privind participarea la cursul de instruire se obțin la sediul unității noastre. **Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiționalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor și păstrate cel puțin 3 ani.**

Nume și prenume fermier/soc.

comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,

adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (